

SU COLONOSCOPIA HA SIDO PROGRAMADA PARA:

Fecha del Procedimiento: _____

Gastroenterólogo: _____

Hora de Llegada: _____

Dirección del Centro: _____

Número de Teléfono: _____

Asistente de Registro: _____

Las citas perdidas o canceladas con menos de 72 horas de anticipación pueden resultar en una tarifa de acuerdo con las políticas de oficina aplicables.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA EL MISMO DÍA DE SU COLONOSCOPIA-DIETA DE LIQUIDOS CLAROS CON Golytely, Nulytely, Trilyte or Polyethylene Glycol 3350 (PEG 3350)

SÍRVASE REVISAR LAS INSTRUCCIONES **POR LO MENOS 3 DÍAS ANTES** DEL PROCEDIMIENTO. GUÍESE POR ESTAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN, **NO USE** LAS QUE VIENEN INCLUIDAS EN LA CAJA DE NULYTE-TRILYTE.



Para garantizar una mejor limpieza es importante que siga estas instrucciones al pie de la letra y que ingiera toda la preparación.

- Si usted está tomando cualquier anticoagulante y/o insulina **Y** esto **NO FUE** discutido con su médico en el momento que se programó la cita, por favor llámenos **ANTES** de comenzar la preparación. Los anticoagulantes incluyen, entre otros: Aspirina, Coumadin-(Warfarina), Coumadin-(Warfarin), Plavix-(Clopidogrel), Xarelto-(Rivaroxaban), Pradaxa-(Dabigatran), Eliquis-(Apixaban), Arixtra-(Fondaparinux), Effient-(Prasugrel), Aggrenox-(Aspirina/Dipyridamole), y todos los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (por ejemplo: Ibuprofeno, Motrin, Aleve, Naproxeno, Celebrex, Mobic).
- **DEBE CONTINUAR TOMANDO TODOS** sus otros medicamentos diariamente antes de la colonoscopia. El día de la colonoscopia tómelos con un pequeño sorbo de agua.
- **SI ES DIABÉTICO, NO** Tome sus pastillas para la diabetes la noche antes o el día de la colonoscopia.
- Agradecemos que haga los arreglos necesarios para su transporte de regreso a casa después del procedimiento. No se le permitirá regresar a casa manejando.
- Usted no puede tomar un Uber, Lyft, taxi o transporte público a su casa sin un acompañante adulto.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA EL MISMO DÍA DE SU COLONOSCOPIA CON Golytely, Nulytely, Trilyte or Polyethylene Glycol 3350 (PEG 3350)



3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

NO coma frutas ni vegetales, incluyendo frijoles, maíz y semillas.

EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO


No ingiera ningún alimento sólido. Si lo desea puede tomar un yogurt líquido solamente en el desayuno antes de la 10 AM, a más tardar. Después de las 10 AM sólo puede tomar líquidos claros. Por ejemplo: agua, café, té, caldo, sodas, jugo de naranja, Gatorade, Kool-aid, Jell-O, popsicles, y caramelos duros.

NO TOME LECHE. NO TOME LÍQUIDOS DE COLOR ROJO O PÚRPURA.

LA TARDE ANTES DEL PROCEDIMIENTO CON NULYTE-TRILYTE

PASO 1:

- Escoja un sabor y vacíe el contenido del paquete en el recipiente.
- Agregue agua tibia hasta donde dice "Fill Line" (Llene hasta esta línea).
- Agite bien la mezcla y colóquela en el refrigerador. No agregue hielo.




EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

PASO 2:

Comenzando a las _____ (7 horas antes de la hora de llegada).

- Comience a tomar la solución.
- Tome un vaso de 8 onzas de la solución cada 10-15 minutos hasta consumir la primera mitad del contenido del recipiente.
- Tome la solución a su propio ritmo.

Si siente náusea o llenura baje el ritmo.




PASO 3:

Comenzando a las _____ (4 horas antes de la hora de llegada)

- Tome la mitad restante del contenido del recipiente a razón de
- un vaso de 8 onzas cada 10-15 minutos.
- Tome la solución a su propio ritmo.

Ingiera la totalidad de la preparación aunque sus heces sean claras y líquidas.



DEBE TERMINAR EL PASO 3 Y NO TOMAR NINGÚN LÍQUIDO DESPUÉS DE LAS _____ (Por lo menos 2 horas antes de la Hora de Llegada)

No dude en comunicarse con nosotros por teléfono si tiene cualquier duda o dificultad con la preparación.

