

## SU COLONOSCOPIA HA SIDO PROGRAMADA PARA:

Fecha del Procedimiento: \_\_\_\_\_

Gastroenterólogo: \_\_\_\_\_

Hora de Llegada: \_\_\_\_\_

Dirección del Centro: \_\_\_\_\_

Número de Teléfono: \_\_\_\_\_

Asistente de Registro: \_\_\_\_\_

## INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA EL DÍA DE SU COLONOSCOPIA-DIETA DE LIQUIDOS CLAROS CON CLENPIQ

SÍRVASE REVISAR LAS INSTRUCCIONES **POR LO MENOS 3 DÍAS ANTES** DEL PROCEDIMIENTO. GUÍESE POR ESTAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN, **NO USE LAS** QUE VIENEN INCLUIDAS EN LA CAJA DE CLENPIQ.



**Para garantizar una mejor limpieza es importante que siga estas instrucciones al pie de la letra y que ingiera toda la preparación.**

- Si está tomando anticoagulantes **Y NO** se lo mencionó al médico cuando programaron su procedimiento, le agradecemos se comunique por teléfono con nosotros **ANTES** de comenzar a tomar la preparación. Los anticoagulantes incluyen, entre otros: Aspirina, Coumadin-(Warfarina), Plavix-(Clopidogrel), Xarelto-(Rivaroxaban), Arixtra-(Fondaparinux), Effient-(Prasugrel), Aggrenox-(Aspirina/Dipirydamole), y todos los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (por ejemplo: Ibuprofeno, Motrin, Aleve, Naproxeno, Celebrex, Mobic).
- **DEBE CONTINUAR TOMANDO TODOS** sus otros medicamentos diariamente antes de la colonoscopia. El día de la colonoscopia tómelos con un pequeño sorbo de agua.
- **SI ES DIABÉTICO, NO** tome sus píldoras para la diabetes el día de la colonoscopia.
- Agradecemos que haga los arreglos necesarios para su transporte de regreso a casa después del procedimiento. No se le permitirá regresar a casa manejando.
- Usted no puede tomar un Uber, Lyft o taxi de regreso a su casa sin un acompañante adulto.





## INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL DÍA ANTERIOR A SU COLONOSCOPIA CON CLENPIQ.



### 3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

NO coma frutas ni vegetales, incluyendo frijoles, maíz y semillas.

### EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO


No ingiera ningún alimento sólido. Si lo desea puede tomar un yogurt líquido solamente en el desayuno antes de la 10 AM, a más tardar. Después de las 10 AM sólo puede tomar líquidos claros. Por ejemplo: agua, café, té, caldo, sodas, jugo de naranja, Gatorade, Kool-aid, Jell-O, popsicles, y caramelos duros.

**NO TOMES LECHE. NO TOMES LÍQUIDOS DE COLOR ROJO O PÚRPURA.**

### LA MAÑANA DEL PROCEDIMIENTO COMIENZE A TOMAR CLENPIQ

#### PASO 1:

- Comience a las \_\_\_\_\_ **(7 horas antes de la hora de llegada)**
- Empiece a tomar la primera botella de Clenpiq.
- Ingiera la totalidad de la preparación



#### PASO 2:

- A continuación tome CINCO (5) vasos de 8 onzas de cualquier líquido claro.
- Aproximadamente 1 vaso cada 30 minutos..

#### PASO 3:

- Comenzando a las \_\_\_\_\_ **(4 horas antes de la hora de llegada).**
- Empiece a tomar la segunda botella de Clenpiq.
- Ingiera la totalidad de la preparación.



#### PASO 4:

- A continuación tome TRES (3) vasos de 8 onzas de cualquier líquido claro.
- Aproximadamente 1 vaso cada 30 minutos.

**Ingiera la totalidad de la preparación aunque sus heces sean claras y líquidas.**

**DEBE TERMINAR EL PASO 4 Y NO TOMAR NINGÚN LÍQUIDO DESPUÉS DE LAS \_\_\_\_\_ (Por lo menos 2 horas antes de la Hora de Llegada)**

No dude en comunicarse con nosotros por teléfono si tiene cualquier duda o dificultad con la preparación. Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana..

