

SU COLONOSCOPIA HA SIDO PROGRAMADA PARA:

Fecha del Procedimiento : _____
 Gastroenterólogo: _____
 Hora de Llegada : _____
 Dirección del Centro: _____
 Número de Teléfono: _____
 Asistente de Registro: _____

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL DÍA ANTERIOR A SU COLONOSCOPIA-DIETA DE LIQUIDOS CLAROS CON CLENPIQ.

SÍRVASE REVISAR LAS INSTRUCCIONES **POR LO MENOS 3 DÍAS ANTES** DEL PROCEDIMIENTO. GUÍESE POR ESTAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN, **NO USE** LAS QUE VIENEN INCLUIDAS EN LA CAJA DE CLENPIQ.



Para garantizar una mejor limpieza es importante que siga estas instrucciones al pie de la letra y que ingiera toda la preparación.

- Si está tomando anticoagulantes **Y NO** se lo mencionó al médico cuando programaron su procedimiento, le agradecemos se comuniquen por teléfono con nosotros **ANTES** de comenzar a tomar la preparación. Los anticoagulantes incluyen, entre otros: *Aspirina, Coumadin-(Warfarina), Plavix-(Clopidogrel), Xarelto- (Rivaroxaban), Arixtra-(Fondaparinux), Effient-(Prasugrel), Aggrenox-(Aspirina/Dipiridamole)*, y todos los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (por ejemplo: *Ibuprofeno, Motrin, Aleve, Naproxeno, Celebrex, Mobic*).
- **DEBE CONTINUAR TOMANDO TODOS** sus otros medicamentos diariamente antes de la colonoscopia. El día de la colonoscopia tómelos con un pequeño sorbo de agua.
- **SI ES DIABÉTICO, NO** tome sus píldoras para la diabetes el día de la colonoscopia.
- Agradecemos que haga los arreglos necesarios para su transporte de regreso a casa después del procedimiento. No se le permitirá regresar a casa manejando.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL DÍA ANTERIOR A SU COLONOSCOPIA CON CLENPIQ.



3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

NO coma frutas ni vegetales, incluyendo frijoles, maíz y semillas.

EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

No ingiera ningún alimento sólido. Si lo desea puede tomar un yogurt líquido solamente en el desayuno antes de la 10 AM, a más tardar. Después de las 10 AM sólo puede tomar líquidos claros. Por ejemplo: agua, café, té, caldo, sodas, jugo de naranja, Gatorade, Kool-aid, Jell-O, popsicles, y caramelos duros.

NO TOME LECHE. NO TOME LÍQUIDOS DE COLOR ROJO O PÚRPURA.


COMIENCE A TOMAR CLENPIQ

PASO 1:

- Comience entre las 5:00 PM y las 7:00 PM
- Empiece a tomar la primera botella de Clenpiq.
- Ingiera la totalidad de la preparación.

PASO 2:

- A continuación tome CINCO (5) vasos de 8 onzas de cualquier líquido claro.
- Aproximadamente 1 vaso cada 30 minutos.



EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO


PASO 3:

- Comenzando a las _____
(4 horas antes de la hora de llegada)
- Empiece a tomar la segunda botella de Clenpiq.
- Ingiera la totalidad de la preparación.

PASO 4:

- A continuación tome TRES (3) vasos de 8 onzas de cualquier líquido claro.
- Aproximadamente 1 vaso cada 30 minutos.

Ingiera la totalidad de la preparación aunque sus heces sean claras y líquidas.



DEBE TERMINAR EL PASO 4 Y NO TOMAR NINGÚN LÍQUIDO DESPUÉS DE LAS _____ (Por lo menos 2 horas antes de la Hora de Llegada)

No dude en comunicarse con nosotros por teléfono si tiene cualquier duda o dificultad con la preparación. Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana.

