

## SU GASTROSCOPIA (EGD) ESTÁ PROGRAMADA PARA:

Fecha del procedimiento: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Médico de Gastro Health: \_\_\_\_\_

Hora de llegada: \_\_\_\_\_

**MetroWest Medical Center**  
115 Lincoln St.  
Endoscopy Department, 1<sup>st</sup> Floor  
Framingham, MA 01702  
503-383-1728

**Boston Endoscopy Center**  
175 Worcester St.  
Wellesley, MA 02481  
617-936-7693

**Charles River Endoscopy**  
571 Union Ave.  
2<sup>nd</sup> Floor, South Entrance  
Framingham, MA 01702  
508-665-4111

Cuando fue programado este procedimiento, el seguro mostrado en su expediente era: \_\_\_\_\_

**Las citas perdidas o canceladas con menos de 5 días de anticipación resultarán en un cargo de \$150 de acuerdo con las políticas aplicables de la oficina. El centro de endoscopia también puede cobrar una tarifa.**

### **EL DÍA ANTERIOR – NO CONSUMA ALIMENTOS SÓLIDOS DESPUÉS DE LAS 10 PM; PUEDE TOMAR LÍQUIDOS CLAROS HASTA 4 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**

\* A excepción de si toma un medicamento GLP-1, véanse a continuación las instrucciones.

POR FAVOR REPASE ESTAS INSTRUCCIONES **POR LO MENOS UNA SEMANA ANTES** DEL PROCEDIMIENTO.

#### **Es importante que siga atentamente todas las instrucciones en este paquete.**

- Si usted está tomando algún anticoagulante Y esto **NO** fue discutido con el consultorio de su médico en el momento de programar el procedimiento, **por favor llámenos al menos 5 días ANTES** de comenzar la preparación. Estos incluyen, pero no se limitan a, **Coumadin-(Warfarina), Plavix-(Clopidogrel), Xarelto-(Rivaroxaban), Pradaxa-(Dabigatran), Eliquis-(Apixaban), Arixtra-(Fondaparinux), Effient-(Prasugrel).**
- Si está tomando algún tipo de insulina Y esto **NO** fue discutido con el consultorio de su médico en el momento de programar el procedimiento, **por favor llame a su médico prescriptor al menos 5 días ANTES** de comenzar la preparación.
- **Debe dejar de tomar cualquier preparación de hierro** (incluyendo multivitaminas) **5 días ANTES del procedimiento.**
- Si está tomando alguno de los siguientes **medicamentos GLP-1: Dulaglutida-(Trulicity), Liraglutida-(Saxenda), Exenatida-(Byetta, Bydureon Bcise), Tirzepatida-(Mounjaro, Zepbound), Semaglutida-(Ozempic, Wegovy, Reybelsus), Lixisenatida-(Adlyxin), Albiglutida-(Tanzeum), deberá tomar SÓLO líquidos claros durante 24 horas antes del procedimiento programado. ¡NO CONSUMA ALIMENTOS SÓLIDOS! ¡Esto es nuevo! Si no sigue estas instrucciones, su procedimiento será cancelado y se le cobrarán todos los gastos de cancelación.**
- **SI USTED ES DIABÉTICO, NO** tome sus pastillas para la diabetes el día de la endoscopia.
- **DEBE SEGUIR TOMANDO TODOS** los demás medicamentos todos los días anteriores a la colonoscopia. **Está bien tomarlos con un pequeño sorbo de agua** el día de su endoscopia.
- **Puede seguir tomando** aspirina, Tylenol y cualquier medicamento NSAID (Ibuprofeno, Motrin, Aleve, Naproxen, Celebrex, Mobic).
- Por favor, haga planes para que alguien le lleve a casa después del procedimiento. **No se le permitirá conducir hasta su casa. Usted no puede tomar un Uber, Lyft, taxi o transporte público a casa** de su procedimiento sin un acompañante adulto.

Por favor llámenos al 508-620-9200 si tiene alguna pregunta o si tiene dificultades con la preparación.