

Instrucciones previas al procedimiento para diabetes o medicamentos GLP-1

Los medicamentos GLP-1 para la diabetes o el control del peso (Ozempic, Wegovy) provocan un retraso de la motilidad gástrica, por lo que es imprescindible que siga estas instrucciones; de lo contrario, su procedimiento podría ser retrasado o cancelado.

- Como preparación para su procedimiento, deberá seguir las instrucciones específicas con relación a su diabetes o a cualquier medicamento GLP-1 (control del peso). Lea atentamente la información que figura a continuación y siga las instrucciones que le haya dado su proveedor para los ajustes de insulina.
- Si prefiere, puede revisar estas instrucciones con su especialista en diabetes.
- **Si tiene una bomba de insulina, consulte a su endocrinólogo para obtener instrucciones específicas.**
- A menos que se indique lo contrario, tome los medicamentos para la diabetes o los medicamentos GLP 1 como se indica a continuación:

Medicamentos para diabetes o GLP-1	7 días antes del procedimiento	Mañana el día antes del procedimiento	La noche antes del procedimiento	Mañana el día del procedimiento
Medicamentos por vía oral o pastillas	Dosis usual	Dosis usual	Colonoscopia: No tome la dosis nocturna. EGD SOLAMENTE: Puede tomar la dosis nocturna.	NO tome la dosis matutina. Reanude cuando esté en casa después del procedimiento.
Insulina	Dosis usual	Dosis usual	Tome la mitad de la dosis usual. Vea la lista con viñetas a continuación.	NO tome la dosis matutina. Reanude cuando esté en casa después del procedimiento.
GLP-1 tomado diariamente *Vea la lista	Dosis usual	NO tomar	NO tomar	NO tome la dosis matutina. Reanude cuando esté en casa después del procedimiento.
GLP-1 tomado semanalmente	Dejar de tomar 7 días antes	NO tomar	NO tomar	NO tome la dosis matutina. Reanude cuando esté en casa después del procedimiento.

Compruebe su nivel de azúcar en sangre la noche anterior al procedimiento y la mañana del procedimiento.

- Si su nivel de azúcar en sangre es menos de 80 en cualquiera de estos chequeos, beba un vaso de jugo de fruta natural y vuelva a comprobarlo. Si es necesario, puede seguir bebiendo jugo de fruta claro hasta 4 horas antes del procedimiento. En ese momento, si su nivel de azúcar en sangre sigue por debajo de 80 o no se resuelven los síntomas, llame a la consulta para recibir más instrucciones.
- Si su nivel de azúcar en sangre es mayor de 350, utilice su insulina de acción rápida o llame a la consulta para recibir más instrucciones.

El día antes de su procedimiento:

- Le recomendamos que beba muchos líquidos claros. Como diabético, normalmente no puede beber mucho jugo. Sin embargo, para la preparación de la colonoscopia, está bien beber Gatorade o jugos que puedan contener azúcar.
- No beba sólo agua o bebidas sin azúcar durante todo el día. Puesto que su ingesta de alimentos está restringida según sus instrucciones individuales, es importante que beba líquidos que contengan electrolitos, azúcar y calorías. Es peligroso que sus niveles de glucosa bajen demasiado. Si sus niveles de glucosa son levemente altos durante un día, no pasa nada.
- Puede alternar jugos claros con caldo claro de pollo o de vegetales.

El día de su procedimiento:

- Puede seguir bebiendo líquidos claros hasta 4 horas antes del procedimiento.
- No tome ningún medicamento para la diabetes antes del procedimiento.
- Antes de salir de casa, compruebe su nivel de glucosa. Informe a nuestra oficina si sus resultados están por debajo de 80 o por encima de 350.
- Una vez finalizada la colonoscopia, puede reanudar su dieta normal. Una vez que empiece a comer de nuevo, podrá empezar a tomar sus medicamentos regulares.
- Es muy importante mantenerse bien hidratado tanto antes como después de la colonoscopia. Siga bebiendo bastante líquido al llegar a casa y durante todo el día siguiente al procedimiento.

Lista de antagonistas de GLP1 1/10/25

Los agonistas del receptor del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) son una clase de medicamentos que tratan la diabetes de tipo 2 y la obesidad. Algunos ejemplos son:

Diarios – en forma de tableta - *deben dejar de tomarse por 1 día*

Semaglutide (Ozempic, Rybelsus)

Liraglutide (Saxenda)

Lixisenatide (Adlyxin)

Inyecciones diarias – *siga las instrucciones para GLP-1 tomado diariamente en la página anterior*

Liraglutide (Victoza)

Inyecciones semanales - *deben dejar de tomarse por 7 días*

Semaglutide (Ozempic, Wegvov)

Dulaglutide (Trulicity)

Exenatide Extended Release (Bydureon, Byetta, BCise)

Tirzepatide (Mounjaro) (Zepbound)

Liraglutide (Victoza) suele ser diaria. ***Pregunte al proveedor cuando debe dejar de tomar.***

	DOSAGE	DOSAGE FORM
Ozempic (SEMAGLUTIDE)	1 WEEKLY	
Rybelsus (SEMAGLUTIDE)	1 DAILY	
Wegovy (SEMAGLUTIDE)	1 WEEKLY	
Trulicity (DULAGLUTIDE)	1 WEEKLY	
Victoza (LIRAGLUTIDE)	1 DAILY	
Saxenda (LIRAGLUTIDE)	1 DAILY	
Byetta (EXENATIDE)	2 DAILY	
Bydureon BCise (EXENATIDE)	1 WEEKLY	
Mounjaro (TIRZEPATIDE)	1 WEEKLY	